

1915

Su due Formiche della Tripolitania.

Monomorium salomonis F., var. *areniphila* Sant.

Il Santschi ha raccolto questa varietà di colorazione a Gabes in Tunisia; le ♀ di Cussabat sono identiche all'esemplare ricevuto dall'autore.

Della stessa località, vi sono ♀, che ritengo spettare alla stessa forma. Esse hanno il corpo nero, opaco, con le mandibole le antenne e le zampe rosso cupo, in parte brunicce.

È notevole la mancanza assoluta di moncherini di ali: il torace è più stretto che nelle altre forme della stessa specie, coi lati esattamente paralleli; presenta la segmentazione solita, ma il profilo è molto meno arcuato. Anche il capo è più stretto. Il gastro è stretto e molto allungato.

Lunghezza 5,6 mm.; senza gastro 3; gastro 2,8; capo $1,1 \times 0,75$; torace $1,4 \times 0,5$; larghezza postpeziolo 0,35.

Monomorium salomonis F., subsp. *planidorsa* n.

Operaia. — Bruno-castagno, capo, clava e femori un poco più scuri, gastro quasi piceo. Scultura a un dipresso eguale alla var. *subnitida* Emery del *M. salomonis-salomonis*. Tutto il corpo è allungato quasi come nella subsp. *termitaria* For. Il capo è molto più lungo che largo, più stretto indietro che innanzi, il lobo sporgente del clipeo è troncato in avanti, non incavato nel mezzo. Grandezza degli occhi come nella subsp. *subopaca* F. Sm. Lo scapo raggiunge il margine occipitale. Il torace è molto depresso, pressochè come nella subsp. *termitaria*; sul profilo non si nota nessunissimo solco o incavo nella sutura meso-epinotale, ma soltanto una leggera depressione a sella; la faccia discendente dell'epinoto è più di due volte più corta della faccia basale, e si congiunge con essa ad angolo ottuso; l'epinoto non presenta nessun solco longitudinale. Il peduncolo addominale è gracile, il postpeziolo di diametro eguale al nodo del peziolo; questo è squamiforme e assai sottile. Le zampe sono relativamente brevi.

Lunghezza 2,2-2,5 mm.; capo senza mandibole $0,6 \times 0,43$.
Cussabat.

p. 378